

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

プラセンタ軟膏 [外皮用薬]

第2類医薬品

パルモア[®]

パルモアは、新鮮な動物胎盤からの抽出物プラセンタエキスと、シパルミチン酸ピリドキシン(脂溶性ビタミンB₆)を配合した皮膚の新陳代謝を高める軟膏です。

本剤は進行性指掌角皮症などの角化症や湿疹、皮膚炎に効果をしめすほか、皮膚の栄養や保護にも使用できる、応用範囲の広い軟膏です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

肌あれ、湿疹、進行性指掌角皮症、口唇炎、口唇き裂、口唇乾燥症、ひび、あかぎれ、にきび、皮膚の栄養及び保護、脂漏性皮膚炎、粧糠疹、日光皮膚炎、酒さ、その他の皮膚乾燥及び角化症

【用語の解説】

- 【進行性指掌角皮症】 主婦や水仕事の多い人におこる手あれや手の湿疹・皮膚炎が進行して亀裂やびらん(ジクジクした状態)が出来たもの。
- 【口唇炎】 くちびるが炎症し、はれ、皮むけ、びらんなどで痛みやヒリヒリ感をともなう状態。
- 【口唇き裂】 くちびるのひび割れ。
- 【口唇乾燥症】 くちびるの乾燥。
- 【脂漏性皮膚炎】 顔や頭などの脂が多い部位にできる湿疹・皮膚炎で、赤みがあり皮膚がフケのように細かくむけてくる状態。
- 【粧糠疹】 皮膚がかさついたり、ポロポロはがれたりする状態。
- 【日光皮膚炎】 日焼けによる皮膚の炎症のこと。
- 【酒さ】 長期飲酒などにより鼻が赤くなったり、にきびができる状態。
- 【角化症】 皮膚の表面にある角質が厚くなる状態。

用法・用量

通常1日2～3回、適量を患部に塗布または塗擦してください。必要によりガーゼなどに塗布し、患部に貼付してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1)用法を守ってください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5)外用にのみ使用してください。

使用時のアドバイス

症状によっては、就寝時などに、本剤を十分に塗布した後、ガーゼを当て、木綿の手袋、靴下、マスクなどで固定しますと効果的です。

敏感な部分(顔面、首、口唇など)や乳幼児に使用する場合は、あらかじめお肌の目立たない部分に少量塗布し、翌日様子を見てから使用してください。

成分と働き

100g中に次の成分を含んでいます。


成分	含量	働き
プラセンターリキッド*	5g	皮膚の新陳代謝を高め皮膚を保護し、うるおいをあたえます。
ジパルミチン酸ピリドキシン	1g	脂溶性のビタミンB ₆ で皮膚に栄養をあたえます。

(油脂性軟膏基剤)

添加物として、グリセリン、ワセリン、リノール酸エチル、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸Na、パラベンを含んでいます。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。また開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。



お問い合わせ先

本剤のご使用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話03-3952-0100
月～金曜日 9：00～17：00（祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



製造販売元
三宝製薬株式会社

東京都新宿区下落合2-3-18